

# DOPORUČENÉ POUŽITÍ U DRŮBEŽE



**\*MSP**  
Marine Sulfated Polysaccharides



## SeaLyt

### SNÍŽENÍ TRÁVICÍCH PROBLÉMŮ

OBSAHUJE MSP\* MUCIN K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY SLIZNICE TRÁVICÍHO TRAKTU

- Startér snáškového cyklu
- Teplotní stres
- Trávicí problémy



Obecné podání: jedna dávka\*\*(•)

#### Spark

1 šumivá tableta 87g / 1000 litrů

1 šumivá tableta 45g / 500 litrů

1 šumivá tableta 16g / 200 litrů

## Searup

### POSILUJE PŘIROZENOU IMUNITU

OBSAHUJE MSP\* S IMUNOMODULAČNÍMI VLASTNOSTMI

- Podpora vakcinačního programu
- Stresová období (snáškový cyklus, reprodukční vrchol, hromadný zástav...)



Obecné podání: jedna dávka\*\*(•)

#### Spark

1 šumivá tableta 80g / 1000 litrů

1 šumivá tableta 45g / 500 litrů

1 šumivá tableta 16g / 200 litrů

#### Still

0.5 ml / litr

0.5 ml / 10 kg živé hmotnosti

## DigestSea

### ZLEPŠUJE TRÁVICÍ FUNKCE, CHRÁNÍ JÁTRA

OBSAHUJE MSP\* S ANTI-HYPERLIPIDEMICKÝMI VLASTNOSTMI

- Období zvýšených metabolických požadavků



Obecné podání\*\*

#### Still

0.3 to 1 ml / litr

0.3 to 1 ml / 10 kg živé hmotnosti

\*\* doporučená denní dávka

# DOPORUČENÍ

# Kuřice



## Startovací období 1. týden

	den1	den2	den3	den4	den5	den6	den7
<b>SeaLyt</b> Stimulace příjmu vody a rehydratace	●	●					
<b>Searup</b> Podpora přirozené imunity	●●●●	●●●●					

Naskladnění kuřic  
(včetně prvních hodin)

## Vakcinační období

	den-3	den-2	den-1	den+1	den+2	den+3
<b>Searup</b> Podpora vakcinace pitnou vodou			●	●	●	
<b>Searup</b> Podpora injekční vakcinace nebo aerosolem			●	●	●	

\* Podle vakcinačního programu

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>SeaLyt</b> Obnova přirozené imunity	●						●				●		●	●		
<b>SeaLyt</b> V případě trávících problémů																
<b>SeaLyt</b> V případě teplotního stresu																
<b>Searup</b> Podpora vakcinace pitnou vodou											*		*	*	*	*
<b>Searup</b> Podpora injekční vakcinace nebo aerosolem											*		*	*	*	*

Čas (v týdnech)

Doporučené podávání: 1 den před vakcinací a 2 dny po

Doporučené podávání: 3 dny

Doporučené podávání: 1 - 3 dny

- jedna dávka
- dvojnásobná dávka




# DOPORUČENÍ

# Nosnice



Standardní snášková křivka u slepic nosného typu:



**Naskladňovací den 16. týden**

	den1	den2	den3	den4	den5	den6	den7
<b>SeaLyt Rehydratace</b>	●						
<b>Searup Obnova přirozené imunity</b>		●●●●					

- jedna dávka
- dvojnásobná dávka

**Searup** Obnova přirozené imunity

**DigestSea** zlepšení trávicích funkcí

**SeaLyt**

V případě trávicích problémů nebo teplotního stresu

doporučené dávkování: 1x týdně + v případě nebezpečí oslabení přirozené imunity

doporučené dávkování: 1x měsíčně po dobu 3 dní: 0.3 ml / liter / den


doporučené dávkování: 1 - 3 dny + v případě zvýšeného rizika

# DOPORUČENÍ

# Brojeři



Standardní křivka mortality brojerů



Doporučené dávkování na den

Doporučené dávkování: na den

Doporučené dávkování: 1-3 dny

