

DOPORUČENÉ UŽITÍ U PŘEŽVÝKAVCŮ



***MSP**
Marine Sulfated Polysaccharides



Diet

PODPORA FYZIOLOGICKÉHO ZAŽÍVÁNÍ
OBSAHUJE VODOU DISPERZNÍ JÍL A MSP* MUCIN K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY SLIZNICE TRÁVICÍHO TRAKTU

- Riziko diarhea
- Dehydratace



Dávkování**

Pasta

1 dávka 30 ml / krmení / 50 kg živé hmotnosti

Powder

40 g / krmení / 50 kg živé hmotnosti

Searup

PODPORA PŘIROZENÉ IMUNITY
OBSAHUJE MSP* S IMUNOMODULAČNÍMI VLASTNOSTMI

- Podpora vakcinačního programu
- Rekonvalescence
- Stresové situace (hromadný zástav zvířat, telení, ...)



Dávkování: obecná dávka** (•)

Still

0.5 ml / 10 kg živé hmotnosti

DigestSea

ZLEPŠUJE DIGESTIVNÍ FUNKCE, CHRÁNÍ JÁTRA
OBSAHUJE MSP* S ANTILIPIDEMICKÝMI VLASTNOSTMI

- Období zvýšených metabolických požadavků (porod, teplotní stres ...)
- Jaterní problémy
- Po medikační léčbě






Obecná dávka : **

Still

0.3 - 1 ml / 10 kg živé hmotnosti


** doporučené denní podání



	čas (v týdnech)
Diet	V případě nebezpečí diarhea <i>doporučené dávkování: po dobu 1 - 2 dnů</i>
Searup	V případě nebezpečí poklesu přirozené imunity <i>doporučení: dvojitá dávka po dobu 3 - 5 dnů</i>
DigestSea	Změna krmení <i>doporučené dávkování: 3 dny</i>


● jedna dávka
●● dvojitá dávka






Searup

Obnova přirozené imunity




Searup

Injekční vakcinace



Zástav do výkrmových skupin



V období zvýšeného zdravotního tlaku

Searup

doporučené dávkování: 3 dny 0.5 ml / 10kg živé hmotnosti

Změna krmení

DigestSea

doporučené dávkování: 3 dny 0.5 ml / 10kg živé hmotnosti

- jedna dávka
- dvojitá dávka

